SUPPLÉMENT A LA LISTE

DES

OISEAUX RECUEILLIS DANS L'ILE ASKOLD

(MANTSCHOURIE)

Par M. TACZANOWSKI

Dans le Bulletin de 1878, p. 133, j'ai publié une liste de 49 espèces d'Oiseaux recueillis dans ce petit îlot par M. Jankowski, au printemps de 1878. Depuis, j'ai reçu du même explorateur un envoi contenant des Oiseaux capturés dans l'automne de la même année et au printemps de 1879 : je donne ici les espèces non comprises dans la 1re liste. Parmi elles, six japonaises et chinoises sont nouvelles pour la faune de la Mantschourie, deux n'ont pas même été signalées par les explorateurs de la Chine ou des autres contrées du continent asiatique.

50. *Pernis cristatus* Cuv., *P. ptilonorhynchus* Steph.

Jeune mâle en premier plumage, pris le 5 novembre 1878.

Comme les jeunes de l'espèce européenne, il a les plumes de la tête, de la nuque et du cou terminées par une bordure blanche, assez large, et les plumes brunes du dos plus foncées au centre ; le dessous du corps est fauve, strié de brun ; la gorge et le devant du cou sont d'un blanc pur, sans aucune trace du collier noir en forme de fer de cheval, plus ou moins distinct chez les adultes. La queue porte sept bandes étroites, foncées, alternant avec d'autres beaucoup plus pâles. Toutes les rémiges sont terminées par une bordure blanche, beaucoup plus large et beaucoup plus distincte que chez les jeunes de l'espèce européenne. Les sous-caudales sont barrées de brun comme chez les adultes, mais les barres sont beaucoup plus fines. Les dimensions sont celles des deux individus de l'Ussuri el du Baical méridional. Longueur totale 661mm ; aile 456 ; queue 300 : elle dépasse l'aile de 77mm. Iris gris bleuâtre (Jankowski).

51. *Pernis apivorus* Lin.

Un mâle tué le 14 octobre 1878 présente les mêmes dimensions que les sujets d'Europe. Il a 614mm de longueur totale, l'aile pliée

410, la queue 240 ; le bec et les pattes sont aussi identiques ; sa coloration présente une des variétés commune en Europe.

Il n'a pas encore été observé dans la Sibérie orientale ; l'abbé David l'a trouvé dans les contrées septentrionales du Céleste Empire (1), M. Sewertzow au Turkestan, et notre exemplaire prouve que la Bondrée commune s'étend jusqu'à l'extrême orient ; elle s'y rencontre avec la forme asiatique, comme les deux éperviers *Accipiter nisus* et *A. virgatus*.

52. *Accipiter nisus* Lin.

Un mâle adulte tué le 9 avril 1879.

53. *Accipiter virgatus* Tem.

Un jeune mâle en premier plumage tué le 6 octobre 1878.

Cet individu a comme le jeune de l'*A. nisus* toutes les plumes des parties supérieures du corps et des ailes bordées de roux ; sa gorge est coupée longitudinalement par un trait noir, bien prononcé ; les taches foncées de la poitrine et du ventre sont plus étendues que dans le jeune de l'Épervier d'Europe. Iris jaune clair (Jankowski).

54. *Scops semitorques* Schl.

Un mâle et deux femelles, tués les 8, 12 et 17 avril 1879.

Ces Oiseaux sont beaucoup moins foncés que celui figuré dans la *Fauna japonica ;* leur demi collier roux est d'une nuance beaucoup plus pâle. Le mâle est beaucoup plus clair que les deux femelles, et présente très-peu de roussâtre sur les flancs ; le facies est plus blanchâtre. Tous ont les doigts emplumés jusqu'a la dernière phalange, comme l'Oiseau du Japon. Iris jaune clair. (Jankowski).

55. *Ninox japonica* Tem. et Schl.

Un mâle tué le 11 septembre 1878.

M. Sharpe, dans son *Catalogue des Oiseaux du Musée britannique* (1875) a réuni spécifiquement les trois formes *N. scutulata* Raffl., *N. borneensis* Bp., et *N. japonica* T. et Schl. Après avoir examiné un grand nombre d'exemplaires de différentes provenances, et comparé l'individu de l'île Askold avec ceux de Bornéo et de Malacca, nous trouvons des différences si grandes et

(1) A. David et Oust., *Ois. de la Chine*, p. 18.

si importantes qu'il nous paraît impossible d'admettre leur identité. Notre Oiseau, en tout conforme à la figure et à la description de la *Fauna japonica,* est beaucoup plus grand que ceux des deux autres formes ; il présente dans la coloration des différences notables, mais une plus importante consiste dans la forme de l'aile, qui est beaucoup plus aiguë dans la *japonica.* Dans les Oiseaux de Bornéo et de Malacca, la 3e et la 4e rémiges sont égales entre elles et sont les plus longues; la 5e est un peu moins longue que les précédentes et distinctement plus longue que la 2e; la distance entre l'extrémité de la 5e et le bout de l'aile est de 6 à 9mm, celle de la 6e au bout de l'aile est de 16 à 28mm.

Dans l'Oiseau d'Askold, la 3e rémige est la plus longue et est distinctement plus longue que la 4e; la 5e, beaucoup moins longue que la 4e, est considérablement plus courte que la 2e; la distance entre l'extrémité de la 5e et le bout de l'aile est de 25mm, celle de la 6e est de 52mm (1). La principale différence de coloration tient aux taches de la poitrine et du ventre, qui dans les Oiseaux de la Malaisie sont plus ou moins roussâtres, et bien distinctes de la couleur brune du dos; tandis que dans la Chouette de l'Askold elles sont brunes, sans aucune nuance rousse, à peu près de la couleur du dos. Les sous-caudales chez les Oiseaux de Bornéo et de Malacca sont blanc pur; chez la Chouette d'Askold, elles sont blanches, mais divisées dans toute leur longueur par une ligne médiane brune. Les bandes fauves sont beaucoup plus prononcées sur les rémiges de la Chouette d'Askold, que sur celles de la Chouette de Malaisie. Les raies claires sur les plumes du tarse sont aussi plus distinctes.

Longueur totale 324mm, aile 240 (9,45 pouces anglais), queue 135. (L'aile de cet oiseau dépasse de 3 p. 5 lignes celle du plus grand des exemplaires examinés par M. Sharpe, provenant de Chefoo en Chine). Iris jaune (Jankowski).

56. *Otus vulgaris* Tlemm.

Une femelle tuée le 21 octobre 1878.

57. *Nyctale funerca* Bp.

Un exemplaire du 4 janvier 1879.

(1) Dans la description de la *Fauna japonica* j'ai trouvé une petite différence dans la proportion des rémiges externes : la 3e et la 4e égales et les plus longues; la 5e beaucoup plus courte et égalant à peu près la 2e.

58. *Herbivox cantillans* Tem. et Schl.

Une femelle tuée le 12 juin 1879, conforme à la description et à la figure de la *Fauna japonica*.

59. *Calamoherpe orientalis* Tem. et Schl.

Un mâle tué le 31 mai 1879.

60. *Horornis squammiceps* Swinh.

Deux mâles du 13 mai 1879.

61. *Reguloides proregulus* Pall.

Un mâle tué le 13 mai 1879.

62. *Nemura cyanura* Pall.

Un mâle adulte du 14 avril 1879.

63. *Calliope camtschatkensis* Gm.

Une femelle du 13 octobre 1878.

64. *Ruticilla aurorea* Pall.

Un mâle du 15 avril 1879.

65. *Accentor montanellus* Pall.

Une femelle du 6 avril 1878.

66. *Accentor erythropygius* Cab.

Un mâle du 17 octobre 1878.

67. *Pratincola indica*.

Une femelle du 9 octobre 1878.

68. *Petrocincla manilla* Bodd.

Une paire des 6 et 11 mai 1879.

69. *Turdus fuscatus* Pall.

Six mâles tués le 12 novembre 1878 et deux, le 28 avril 1879.

70. *Turdus pallidus* Gm.

Un exemplaire sans indication de sexe, du 15 novembre 1878.

71. *Turdus obscurus* Gm.

Un mâle tué le 15 mai 1879.

72. *Turdus pelios* Bp.

Un mâle adulte du 14 avril 1879.

73. *Turdus sibiricus* Pall.

Un jeune Oiseau sans indication de sexe, tué le 6 octobre 1878.

74. *Motacilla ocularis* Swinh.

Deux femelles tuées le 18 mai 1879.

75. *Parus minor* Tem. et Schl.

Une paire des 28 novembre et 6 décembre 1878.

76. *Parus ater* Lin.

Une femelle du 12 octobre 1878.

77. *Mecistura caudata* Linn.

Une paire des 20 et 21 octobre 1878, parfaitement identique aux Oiseaux du Baical et de la Daourie, à tête toute blanche.

78. *Bombycilla phœnicoptera* Tem.

Deux mâles et une femelle des 20 et 26 mai 1879.

79. *Pericrocotus cinereus* Lafr.

Un mâle.

80. *Otomela lucionensis* Lin.

Une femelle des 9 et 12 juin 1879.

81. *Otomela magnirostris* Lin.

Deux mâles des 9 et 12 juin 1879.

82. *Nucifraga caryocalhactes* Lin.

Deux exemplaires sans indication de sexe, des 15 et 16 octobre 1878.

83. *Euspiza variabilis* Tem.

Un jeune mâle du 13 octobre 1878 et une femelle adulte.

84. *Emberiza leucocephala* Gm.

Un mâle du 12 mai 1879.

85. *Emberiza chrysophrys* Pall.

Un mâle du 12 mai 1879 et deux femelles

86. *Emberiza Tistrami* Swinh.

Deux mâles tués en mai 1879.

87. *Schœnicola Pallasi* Cab.

Un mâle du 12 mai 1879.

88. *Fringilla montifringilla* Lin.

Deux mâles et une femelle des derniers jours d'avril 1879.

89. *Coccothraustes japonicus* Tem. et Schl.

Une femelle du 3 mai 1879.

90. *Eophona personata* Tem. et Schl.

Un jeune mâle du 20 octobre 1878.

91. *Carpodacus roseus* Pall.

Deux mâles des 13 et 26 octobre 1878.

92. *Carpodacus erythrinus* Pall.

Un mâle du 2 mai 1879.

93. *Pyrrhula cineracea* Cab.

Un mâle du 5 avril 1879.

94. *Pyrrhula orientalis* Tem. et Schl.

Un mâle du 12 novembre 1878.

95. *Leucosticte brunneinucha* Brandt.

Une femelle du 24 octobre 1878.

96. *Lòxia albiventris* Swinh.

Une femelle du 18 octobre 1878.

97. *Cuculus himalayanus* Vig.

Un mâle adulte du 9 juin 1879, complètement semblable au mâle capturé en 1875, par le Dr Dybowski, sur la côte voisine de cet îlot, et qui n'en diffère que par la mandibule inférieure beaucoup plus jaune. M. Jankowski a aussi indiqué comme le Dr Dybowski : « iris fusco-cinerea. »

98. *Cuculus canorinus* Müll.

Une femelle.

99. *Ardetta sinensis* Gm.

Une femelle adulte, tuée le 27 mai 1879, comparée à un exemplaire d'Amoy, prevenant de la collection Swinhoe.

100. *Butorides macrorhynchus* Gould.

Une femelle adulte.

101. *Tringa cinclus* Linn.

Une femelle du 11 octobre 1878.

102. *Gallinago scolopacina* Bp.

Une femelle tuée le 15 mai 1879.

103. *Spilura Horsfieldi* Gr.

Un mâle du 3 mai 1879.

Rectification. Dans cet envoi de M. Jankowski, il y a une série de 12 Tarins, recueillis dans l'îlot, à la fin d'octobre 1878 et dans les premiers jours de mai 1879. Cette série présente 9 mâles, qui prouvent évidemment que j'ai eu tort de séparer cet Oiseau spécifiquement, et que les caractères indiqués dans ma description ne sont pas constants. Sur ces 9 mâles, 7 portent une tache noire gutturale, et 2 seulement ne l'ont pas. Je me suis convaincu d'ailleurs que, parmi les Oiseaux d'Europe, on trouve aussi une différence individuelle semblable. Le *Chrysomitris Dybowski* doit donc disparaître de la science, et être remplacé dans mes deux listes, publiées dans le *Bulletin* de 1876, p. 180, et dans celui de 1878, p. 138, par le *C. spinus* Lin., comme l'ont déjà fait MM. A. David et Oustallet dans les *Oiseaux de la Chine,* p. 337.

Un nid de *Xanthopygia leucophrys,* trouvé par M. Jankowski au fond d'un trou d'arbre, est composé en dessous de feuilles sèches, dont la plupart n'ont conservé que les nervures, mélangées avec quelques tiges de différentes herbes et quelques morceaux d'écorce; l'intérieur est tapissé de brins très-fins de graminées. La texture, quoique peu fournie, est solide, en forme de coupe peu profonde, de 10 centimètres de largeur et de 3 de profondeur.

Les œufs ressemblent à ceux de l'*Erythrosterna parva,* mais sont plus gros. Leur forme est ovée; leur plus grande largeur se trouve au tiers de la longueur; le petit bout est fort mince et aigu, le gros considérablement atténué. La couleur du fond est d'un blanc jaunâtre, varié de nombreuses taches irrégulières roux-pâle,

distribuées sur toute la surface, mais plus grandes et plus nombreuses au gros bout. La coque est mince, polie et luisante sur la surface. Longueur 18^{mm}3, largeur 14^{mm}.

Le nid de l'*Herbivox cantans,* trouvé à terre, au pied d'un petit buisson, est construit d'une épaisse couche de feuilles sèches, très-longues et larges, d'une graminée aquatique, solidement mariées les unes aux autres, et comprenant dans leur texture quelques feuilles sèches d'arbres. La forme est celle d'un globe comprimé, dont un côté est beaucoup plus élevé que l'autre ; l'intérieur est profond, soigneusement tapissé au fond de graminées délicates et fines et de quelques grosses plumes de Faisans. L'entrée très-large est du côté le plus bas ; il paraît que le côté opposé était appuyé aux tiges du buisson. Diamètre externe 13 centimètres, hauteur 14, hauteur du côté bas 7, diamètre de l'intérieur 8. En général ce nid ressemble beaucoup à celui de la *Locustella luscinioides*.